



コミナティ6か月～4歳用(ファイザー社)を受けたお子様の保護者の方へ

〈 新型コロナワクチンを受けた後の注意点 〉



ワクチンを受けた後は**15分以上**
接種会場で様子を見てください※。

お待ちの間も、感染対策をお願いします。

※過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は、30分ほどお待ちください。

(マスクをする、隣の人と距離をとる、会話を控えるなど)

接種日当日

●接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

| | |
|----------|--|
| アナフィラキシー | <ul style="list-style-type: none"> ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。 ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。 ・起こることは極めてまれですが、接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。 |
| 血管迷走神経反射 | <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、ふらついたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。 ・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になったり、抱っこをしたりして休めば自然に回復します。 ・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座らせたり、抱っこをしてあげたりして、様子を見てください。 |

ワクチンを受けた日の注意点

- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動等は控えてください。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。



数日

●接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

出典：審査報告書より

| 年齢 | 症状(発現割合:1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後) | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------|------|-----------------|
| 生後6か月～1歳 | 易刺激性※1 | 51.2%→47.4%→43.6% | 発熱 | 7.2%→7.4%→6.8% |
| | 食欲減退 | 22.2%→22.2%→20.2% | 腫脹※3 | 3.9%→3.9%→2.7% |
| | 傾眠状態※2 | 27.0%→23.8%→19.9% | 発赤 | 10.6%→9.3%→7.1% |
| | 圧痛 | 16.6%→15.0%→16.0% | | |
| 2歳～4歳 | 疼痛 | 30.8%→31.0%→26.7% | 腫脹※3 | 3.7%→5.7%→3.1% |
| | 疲労 | 29.7%→25.7%→24.5% | 嘔吐 | 3.0%→3.4%→1.6% |
| | 発赤 | 8.8%→11.4%→10.9% | 悪寒 | 2.3%→3.0%→3.3% |
| | 下痢 | 7.7%→6.7%→5.1% | 筋肉痛 | 2.4%→2.6%→2.0% |
| | 発熱 | 5.2%→4.9%→5.1% | 関節痛 | 0.8%→1.4%→1.3% |
| | 頭痛 | 4.5%→4.6%→4.9% | | |

(※1) 機嫌が悪い (※2) 眠たくなる様子 (※3) 注射部位の腫れ

- ・接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。
- ・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。



◎新型コロナワクチンに関する相談先

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| ワクチン接種後に、体に異常があるとき | ➡ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、市町村や都道府県の窓口 |
| ワクチン接種全般に関するお問い合わせ | ➡ 市町村の窓口 |

◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金の給付など）が受けられます（※）。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

※その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンは3回セットで接種します

●接種後に現れた症状の種類によっては、次の接種を受けない方がよいこともありますので、接種後に気になる症状に現れた場合は、受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

●接種間隔 生後6か月から4歳のお子様は、**合計3回接種**して、初回接種が完了します（※）。

3回で1セットですので、早めの接種予約をご検討ください。

（※）5歳以上の方の初回接種は1・2回目接種の合計2回です。

1回目接種後、通常3週間あけて2回目を受け、2回目接種後、8週間あけて3回目を受けます。通常の間隔を超えた場合には、なるべく速やかに接種してください。



（※）最短で19日後からの接種が可能です。例の場合、11月22日が11月20日になります。

◎ワクチンを受けた後も、手洗いなど、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

具体的には、「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒、こまめな換気の励行などをお願いします。



感染予防対策
を継続して
いただくよう
お願いします。



密集した場所



密接した場面



密閉された空間



石けんで手洗い



手指の消毒



こまめな換気

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 乳幼児 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

